

Ueber
ausgedehnte Polyposis
des Dickdarms.

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung

der

DOKTORWÜRDE

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn

Vorgelegt

von

FRANZ TOLLMANN

aus Grevenbroich (Rhld.)



Bonn 1936

Buchdruckerei KUBENS Nachflg., Maxstr. 75.

Gedruckt mit Genehmigung
der mediz. Fakultät der Universität Bonn

Referent: Prof. Dr. Graff

Korreferent: Prof. Dr. Freihr. v. Redwitz



Das Vorkommen einzelner oder mehrerer Schleimhautpolypen im Intestinaltraktus wird sehr häufig beobachtet. Ziemlich selten dagegen sind die Fälle, in denen die gesamte Mukosa größerer Darmabschnitte, namentlich des ganzen Dickdarms oder wenigstens größerer Teile desselben, eine polypöse Entartung zeigt. Überall erscheint die Schleimhaut mit zahllosen polypösen Wucherungen besetzt.

Ein sehr interessanter Fall von solchen warzigen und polypösen Entartungen der Schleimhaut des Dickdarms gelangte in der Klinik des Herrn Prof. Graff zur Beobachtung.

Frau G., 39 Jahre alt, hat zwei gesunde Kinder. Von früheren Krankheiten wußte sie nichts Besonderes zu berichten. Erbliche Belastung schien nicht in Frage zu kommen. Seit Monaten leidet Patientin an Darmbeschwerden, die sich zuerst in ziehenden Schmerzen im Unterleib, dann in Krämpfen mit häufigem Stuhldrang kundtaten. Dabei bemerkte Frau G., daß der früher immer normale Stuhl breiig wurde und häufig mit Schleim und etwas Blut bedeckt war. Das Allgemeinbefinden war zunächst nicht wesentlich gestört, sodaß die Kranke mehrere Monate lang keine ärztliche Hilfe in Anspruch nahm. Erst als Blut- und Schleimabgang stärker und die Schmerzen heftiger wurden, suchte Frau G. den Facharzt Dr. K. auf. Dieser stellte bei der rektoskopischen Untersuchung im Rektum eine geschwulstverdächtige Wucherung fest und ordnete die Aufnahme ins Krankenhaus an. Hier wurde in Gemeinschaft mit dem Chirurgen zunächst eine genauere rektoskopische Untersuchung vorgenommen. Dabei wurde, vier Zentimeter vom Anus entfernt, eine zapfenartige Geschwulst, die beweglich schien und ins Lumen des Rektoskops hineinragte, festgestellt. Ein weiteres Vordringen des Rektoskops wurde durch diese Geschwulstmaßen verhindert. Die Oberfläche des Zapfens war ulzeriert und zugleich blutig imbibiert. Es gelang mit der Schlinge, einen Teil des Tumors zu entfernen. Die exstirpierten Teile wurden dem Pathologischen Institut der Universität in Bonn zur mikroskopischen Untersuchung zugesandt. Die mikroskopische Untersuchung

ergab zunächst, daß es sich um einen fibrösen Schleimhautpolypen handelt, der an der Oberfläche ulzeriert war. Aus dem histologischen Bilde ergab sich aber, daß immerhin auf Bösartigkeit geschlossen werden mußte. Ein Verdacht auf Malignität war nicht von der Hand zu weisen.

Aus diesem Grunde wurde beschlossen, den Tumor auf sakralem Wege radikal zu entfernen. In der Narkose wurde das Rektum von hinten her freigelegt. Das Steißbein und der unterste Teil des Kreuzbeins wurden entfernt. Nach der Mobilisation wurde das Rektum vorgezogen und zunächst vorsichtig eröffnet, da äußerlich an der Wand keinerlei Verhärtungen, die bisher für einen bösartigen Tumor sprachen, palpatorisch festzustellen waren. Nach der Eröffnung des Rektums in der Längsrichtung quollen direkt aus der Schnittfläche eine Unmenge weicher, samtartiger Tumoren heraus, sodaß die Rektalschleimhaut gar nicht mehr zu erkennen war.

Bei der digitalen Untersuchung von der Eröffnungsstelle aus fand sich der ganze Mastdarm, soweit er der Untersuchung zugänglich war, mit solchen weichen, samtartigen, polypösen Massen besetzt.

Es wurde eine Anzahl dieser rundlichen, teils unregelmäßig geformten, warzigen und polypösen Gebilde entfernt. Mit einem scharfen Löffel wurde dann das Rektum vorsichtig ausgekratzt, wobei die Auskratzungsbeute verhältnismäßig gering war, da die Polypen gestielt waren und daher dem scharfen Löffel immer wieder auswichen. Eine energische Exkochleation war bei der veränderten Wand infolge der Perforationsgefahr nicht angebracht.

Da es somit nicht erkennbar war, wie weit die Polyposis hinaufreichte, mußte von einer Totalentfernung der erkrankten Teile, die sonst immer ausgeführt werden mußte, abgesehen werden. So blieb in diesem Falle nichts anderes übrig, als die Inzisionsstelle am Mastdarm wieder zuzunähen.

Die Heilung verlief bei der Patientin ungestört. Da aber die Operation nur als palliative Maßnahme aufgefaßt werden mußte, blieben die Beschwerden natürlich unverändert bestehen. In der Folgezeit traten starke Diarrhoen und darauffolgende heftige Schmerzen im Unterleib noch mehr in den Vordergrund. Auch der mit blutigem Schleim untermischte, oft übelriechende Stuhl blieb weiterhin bestehen.

Die dem Pathologischen Institut überlieferten Teile ergaben folgenden mikroskopischen Befund:

Zum Teil bestehen die exstirpierten Gebilde aus polypösen Schleimhautwucherungen mit stark entzündlichem Einschlag. Die Drüsen erscheinen stark verlängert und sind von ganz unregelmäßigem Verlauf, dazu reich verzweigt, sodaß oft traubige Drüsenkomplexe entstehen. Andere Stückchen zeigen Atypien und zystische Umbildungen von Drüsen. Fast überall wird der Epithelbelag von zwei- bis dreifach unregelmäßig geschichtetem Zylinderepithel gebildet und ist häufig mit knospenartigen Vorsprüngen besetzt. Auch ist die Grenze der Muskularis mukosae nicht scharf zu sehen. Ein anderes Schleimhautstück zeigt neben diesen Atypien der Drüsen ein regelrecht gefäßreiches, geschwulstartiges Granulom. Aus dem histologischen Befund ist nicht mit voller Sicherheit zu sagen, ob es sich um eine gutartige entzündlich veränderte, adenomatöse Polypenbildung oder bereits um eine beginnende maligne Geschwulstbildung handelt. Ganz sichere Anhaltspunkte für Carzinom haben sich an den untersuchten Stückchen nicht ergeben. Die mitgesandten Appendicis epiplocae zeigen neben leichten bindegewebigen Einlagerungen nur Fettgewebe.

Es handelt sich demnach um eine ausgedehnte Polyposis rekti, deren Ausmaß durch die weitere Untersuchung nicht festzustellen war.

Da die Patientin einen weiteren Eingriff, für den natürlich keine Garantie auf Heilung unternommen werden konnte, ablehnte, blieb nichts anderes übrig, als die Patientin ihrem Schicksal zu überlassen. Versuche, die Beschwerden und namentlich die Blutungen durch Darmspülungen mit Adstringentien oder ätzenden Mitteln günstig zu beeinflussen, waren erfolglos. Im Gegenteil nahmen die Beschwerden durch diese Maßnahmen noch zu. Auch die Anlegung eines Anus praeter naturalis, nach dessen Anlegung man häufig beobachtet, daß die Beschwerden und namentlich die Blutungen wohl durch Rückgang der begleitenden entzündlichen Erscheinungen geringer werden, wurde abgelehnt. Die Patientin verblieb noch ungefähr zwei Monate im Krankenhaus und wurde dann in häusliche Pflege entlassen mit dem Auftrag, bei weiterer Verschlechterung zum Krankenhaus zurückzukommen. Patientin verblieb in ihrem Wohnsitz auf dem Lande und kam dem Vorschlag, ins Krankenhaus zurückzukehren,

nicht nach. Sie starb nach ungefähr drei Monaten unter fortschreitender Cachexie, sodaß die gewünschte Obduktion leider nicht erfolgen konnte.

Nach diesem Befund müssen für die Entstehung dieser warzigen und polypösen Schleimhautwucherungen folgende Momente in Betracht gezogen werden:

Zunächst stellen sich an einzelnen Drüsen oder Drüsengruppen Veränderungen des Epithelbelags ein, die sich primär in Vergrößerung der Zelle, in einer intensiveren Färbbarkeit des Zellkerns und des Protoplasmas äußert. Die beiden letzten Veränderungen beruhen wohl auf einer Veränderung der chromatophilen Substanz in der Zelle. Mit diesen Veränderungen müssen die Zellen ihre physiologische Funktionsfähigkeit verlieren. Dadurch, daß die Neubildung von Zellen den Verbrauch übersteigt, wird der Epithelbelag allmählich mehrschichtig. Formveränderungen progressiver Art stellen sich auch an den Drüsenkörpern ein. Die Drüsen werden länger und weiter; selbst die einfachen Drüsen des Mastdarms bekommen Ausbuchtungen der Wand und treiben Seitenprosse und Ausläufer. So entstehen schließlich komplizierte, verzweigte Drüsenkomplexe. Das Schleimhautgewebe verhält sich bei allen diesen Vorgängen zunächst völlig passiv. Das Wachstum der Drüsen erfolgt so langsam, daß die Membrana propria derselben sich dem Drüsenkörper anpaßt; sogar die Verzweigungen der entarteten Drüsen sind noch mit einer Membrana propria versehen. Auch das interglanduläre Gewebe erscheint zunächst völlig normal, ebenso sind in der Submukosa keinerlei erhebliche Veränderungen vorhanden. Diese Drüsenwucherungen führen, indem immer mehr Drüsen in den Entartungsbezirk hereingezogen werden, zunächst zur Bildung umschriebener kleiner, warzenförmiger, flacher Erhebungen auf der Scheimhaut. Nehmen nun diese entarteten Drüsen durch Bildung neuer Seitenprozesse und Ausläufer an Umfang zu, so muß schließlich die Hervorwölbung größer werden; es kommt zur Bildung kleiner polypöser Geschwülstchen. Die Weiterentwicklung dieser Polypen wird nun dadurch noch besonders begünstigt, daß durch den Druck der nachwärts steigenden Kotmassen eine Zerrung erfolgt, wodurch die Basis der kleinen polypösen Gebilde zu einem längeren Stiel ausgezogen wird. Die Entstehung der großen Polypen mit gelappter, unregelmäßig ausgebuchter, traubig verzweigter Oberfläche kann man sich dadurch erklären,

daß ganze Gruppen kleiner Schleimhautwarzen, die sich anfangs getrennt und unabhängig voneinander entwickeln, bei ihrer weiteren Ausbreitung untereinander konfluieren. So kommt es zur Entwicklung eines breiten, gemeinsamen Stieles, während die Oberfläche dieser Bildungen zerklüftet, fazettiert erscheint.

Es ist ganz erklärlich, daß diese größer werdenden polypösen Geschwülste immer mehr unter dem Druck und der Zerrung seitens des Darminhalts zu leiden haben. Namentlich im Mastdarm verursachen die harten Kotmassen einschneidende Veränderungen. Daher ist es selbstverständlich, daß zu den primären Erscheinungen sich chronisch entzündliche Prozesse im Mukosagewebe und auch in der Submukosa hinzugesellen. Diese Prozesse finden ihren Ausdruck in kleinzelligen entzündlichen Infiltrationen, in erheblichen Bindegewebs- und Gefäßneubildungen. Neben dem Druck durch die Kotmassen werden nun auch die entzündlichen Vorgänge eine atypische Epithelwucherung veranlassen. So sind die karyokinetischen Figuren im Epithelgewebe wohl erklärlich.

Ob die Entwicklung jener massenhaft auftretenden warzenförmigen und polypösen Wucherungen im Mastdarm auf eine angeborene Anomalie zurückzuführen sind, oder ob entzündliche Prozesse die Vorgänge veranlassen, ist auf den ersten Blick schwer zu entscheiden. Später wird auf diese Frage noch näher eingegangen werden. Doch kann jetzt schon gesagt werden, daß die entzündlichen Erscheinungen in den zahlreichen kleinen warzigen Erhebungen sowie in der Submukosa ganz geringfügiger Natur sind. Anders ist es in den länglichen, durch die Kotmassen ganz besonders gereizten Gebilden. Im Ganzen kann man sagen, daß entzündliche Prozesse für die Entstehung dieser starken Wucherungen nicht in Frage kommen.

Wie aus der Literatur ersichtlich, sind polypöse Wucherungen des Rektums gar nicht so selten. Als Ursache dieser Bildung werden Schleimhautdefekte nach chronischen Entzündungen z. B. nach Dysenterie, Typhus und ähnlichen Erkrankungen angenommen. Die Ursache der multiplen Polypenbildung wird aber wohl eine andere sein. Wohl sind Fälle beschrieben, wo nach ausgedehnten Substanzverlusten in der Mukosa, namentlich nach dysenterischen Prozessen, ganz besonders im Dickdarm multiple Polypen auftreten können. Diese Gebilde gehen dann sehr wahr-

scheinlich aus stehengebliebenen Resten des Drüsengewebes hervor. Doch ist bei dieser Entstehung mehr an hyperplastische Bildungen zu denken, die sich im unteren Dickdarmabschnitt als warzige oder polypöse Entartungen dokumentieren. Bei vorliegendem Fall wird es sich aber um eine angeborene Anomalie handeln. Whithead beschreibt einen Fall von multiplen polypösen Wucherungen im Rektum und Kolon bei einem 21 Jahre alten Menschen, bei dem in der Anamnese auch keine Anhaltspunkte für eine vorherige Entzündung am Intestinaltraktus vorhanden waren. In der mir zugänglichen Literatur waren sehr viele Fälle zu finden, wo die multiple Polypenbildung sich nur auf erblicher Grundlage entwickelt haben kann. Bei meinem Fall können wohl entzündliche Einflüsse, auch wenn sich klinisch keine Zeichen dafür fanden, auf das weitere Wachstum der polypösen Bildungen großen Einfluß gehabt haben; primär bedingt haben sie die multiplen Drüsen und Wucherungen wohl nicht.

Wichtiger als die Frage nach der Ursache der Polyposis ist die Tatsache, daß namentlich im Rektum multiple polypöse Wucherungen sehr oft mit Krebs kombiniert sind.

Ein interessanter Fall von Dickdarmkrebs in Verbindung mit ausgedehnter Polypenbildung kam in der Klinik des Herrn Prof. Martini (Bonn) zur Beobachtung.

Frl. Sch. aus R., 66 Jahre alt, hatte gesunde Eltern, die in hohem Alter gestorben sind. Als Todesursache wurde Altersschwäche angegeben. Geschwister der Patientin leben und sind gesund.

Sch. ist unverheiratet und weiß von erblichen Krankheiten nichts zu berichten. Als Kind hat sie Masern und als junges Mädchen Chlorose gehabt. Mit 30 Jahren zog sich die Kranke eine Erkältung zu, die mit einem Rheumatismus in der Rückenmuskulatur einherging.

Vor einem halben Jahre bemerkte Patientin zum ersten Male Blut im Stuhl. Das Blut sah hellrot aus und war mit Schleim durchsetzt. Gleichzeitig traten starke Durchfälle auf, die mit Obstipationen abwechselten. Frl. Sch. nahm aber diese Erscheinungen nicht besonders ernst. Bald traten starke Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme von 6 Pfund hinzu. In der letzten Zeit machte sich ein besonderes Unbehagen im Unterbauch bemerkbar, das sich in ziehenden Schmerzen und starken Tenesmen kundtat.

Auf Anordnung des Arztes wurden Haferfchleim seit 14 Tagen als einzige Kost genommen. Es entstand Widerwillen gegen alle Speisen; Fieber wurde nicht beobachtet. Früher will Patientin nie Verdauungsbeschwerden gehabt haben. Auch wurden früher nie Schmerzen, wohl viel Rumoren und Kullern im Leib beobachtet.

Bei der Einlieferung in die Medizinische Klinik befand sich Patientin in einem reduzierten Ernährungszustand. Hautfalten blieben nicht stehen. Muskulatur und Fettpolster waren mäßig ausgebildet. Haut und Schleimhäute zeigten eine sehr schlechte Durchblutung; Oedeme bestanden nicht. Im Harn waren Urobilinogen, im Sediment Leukozyten und Eosinophile stark positiv. Das Blut zeigte eine Haemoglobingehalt von 60%. Die Zahl der Erythrozyten betrug 4,6 Mill., die der Leuko. 6400.

Der Leib der Kranken war leicht vorgewölbt, etwas meteoristisch. Es bestand eine Pulsation im Epigastrium. Die Bauchdecken waren verhältnismäßig stramm, die Inguinaldrüsen nicht zu tasten. Im linken Unterbauch war eine Resistenzvermehrung eben fühlbar.

Patientin fühlte sich in der Klinik wohl und verlangte sogar Nahrungszulage. Nach einem milden Kamilleneinlauf zur Rektoskopie Vorbereitung traten schlagartig Kollapsererscheinungen, Meteorismus, Aufstoßen, Fazies abdominalis auf. Trotzdem die augenscheinlichen peritonitischen Erscheinungen auf eine Perforation hinwiesen, konnte wegen der Schwere des Krankheitsbildes und der Ausichtslosigkeit jedes Eingriffes über eine Laparotomie nicht mehr diskutiert werden. Der Exitus erfolgte einige Stunden nachher.

Der Röntgenbefund ergab eine erhebliche Dilatation des ganzen Kolons. Im Rektum und Sigmoid waren auf allen Bildern nur Breispuren nachweisbar. Der Kontrastbrei passierte diese Stelle nur äußerst langsam.

Klinisch konnte also festgestellt werden, daß nach der kurzen Anamnese und den klinischen Symptomen, die in der Hauptsache in Kachexie, sekundärer Anemie, Beschleunigung der Senkung, blutigen Diarrhoen bestanden, dringender Verdacht auf einen bösartigen Prozeß im unteren Dickdarm bestand. Röntgenologisch verstärkte sich dieser Verdacht durch die Darstellung eines infiltrativen Rektumprozesses, der auch digital mit der Fingerkuppe zu erreichen war.

Die im pathologischen Institut der Universität Bonn vorgenommene

Sektion ergab ein Rektumkarzinom mit Darmperforationen und Perforationsperitonitis. In der Ampulle des Rektums wurde ein ulzeriertes, ringförmiges, stenosierendes Karzinom festgestellt. Metastasen im periproktalen Gewebe und in den Lymphknoten des kleinen Beckens waren nachweisbar. Im Rektum, Sigmoid und Kolon deszendens befanden sich zahlreiche Polypen. Das stark erweiterte und hypertrophierte Kolon sigmoideum zeigte außerdem sterkorale Dekubitalgeschwüre. Eine breite Perforationsstelle im Bereich eines Dekubitalgeschwüres fiel neben einer diffusen, frischen, kotigen Peritonitis besonders in die Augen. Die Organuntersuchung ergab eine kapuläre Haemosiderosis der Milz. Ferner war eine Endometritis polyposa vorhanden. Die Harnwege zeigten neben einer chronischen Urozystitis und einer Pyelitis eine Ureteritis granulans.

Wichtig an dem ganzen Krankheitsbild ist, daß polypöse Mukosawucherungen mit Krebs kombiniert waren. Es mußte daher untersucht werden, ob sich makroskopisch oder mikroskopisch irgendwelche Anhaltspunkte dafür ergaben, daß der Krebs in unmittelbarer Beziehung zu den polypösen Wucherungen stände.

Neben einem typischen Adenokarzinom wurden bei der Sektion zahlreiche warzenförmige und papilläre Auswüchse der Mukosa festgestellt, die einen teils weicheren, teils derberen Eindruck machten. Diese Wucherungen erstreckten sich über das ganze absteigende Darmrohr, waren aber im Rektum besonders zahlreich vorhanden. In der Nähe der karzinomatösen Wucherung waren die Grenzen zwischen den Lieberkühn'schen Drüsen und der Submukosa bzw. der Muskularis mukosae unregelmäßig. Einzelne Drüsenschläuche gingen tief in die Submukosa. Das Zwischengewebe zeigte eine kleinzellige Infiltration. Die in die Submukosa vorgedrungenen Drüsenschläuche bestanden aus kleinen, meistens kubisch gestalteten Zellen. An manchen Stellen in der Nähe der karzinomatösen Wucherung waren solide Zelizapfen in der Submukosa nachweisbar. Wichtig ist, daß die in der näheren Umgebung des Krebses befindlichen pilzförmigen polypösen Wucherungen ganz dieselben Zelizapfen zeigten, wie die in die Submukosa eingedrungenen Drüsenschläuche. Während die der näheren Umgebung entnommenen und untersuchten Polypen Verzweigungen aufwiesen, eine unregelmäßige

Grenze zwischen Muskularis mukosae zeigten, gehörten die weiter von dem Karzinom entfernt stehenden Wucherungen der Schleimhaut an. Ein Durchbrechen der physiologischen Grenzen, ein Übergreifen auf fremdes Gewebe konnte an den Polypen, die dem maligne entarteten Gewebe weiter entfernt lagen, nicht festgestellt werden. Die Untersuchung an anderen polypösen Gebilden führte zu einem besonders interessanten und wichtigen Ergebnis. Es ergab sich, daß dort, wo die diesbezüglichen polypösen Gebilde der Mukosa aufsaßen, gar keine Muskularis mukosae vorhanden war und die Polypen einem Narbengewebe aufsaßen. Auf Grund dieses Befundes ist die Annahme berechtigt, daß die polypösen Wucherungen erst sekundär entstanden sind. Vielleicht hatte die Patientin früher eine Kolitis oder eine ähnliche Darmaffektion durchgemacht, die zum Verlust der Mukosa und der Muskularis mukosae geführt hat. Man kann sich das Entstehen der Polypen dann so erklären, daß die Schleimhautwände am Rande der Substanzverluste zu warzenförmigen gestielten, polypösen Gebilden ausgezogen werden. Auf den Narben bilden sich dann eine Menge dicht nebeneinander stehender warziger Schleimhautexkreszenzen, zwischen denen die fibröse Basis, von der sie sich erheben, sichtbar wird. In der Anamnese waren Anhaltspunkte für eine entsprechende frühere Krankheit nicht zu finden. Den gleichen Vorgang kann man beim Magenulkus beobachten. Auch hier kommt es zum Verlust der Mukosa und der Muskularis mukosae. Das schädliche Agens macht aber auch dann noch nicht halt. Es tritt ein teilweiser oder vollständiger Untergang auch der Submukosa ein. Die neue Mukosa sitzt dann direkt einem Narbengewebe auf. Auf jeden Fall ist der pathologische Befund so eindeutig, daß das Entstehen wenigstens eines Teiles der Polypen auf Grund einer früheren Entzündung zu erklären ist. Ob nun die Ausziehung der Randpartien einer Ulzeration rein mechanisch zur Polypenbildung geführt hat, oder ob das gleiche schädigende Agens, das zur Ulzeration führte, auch die polypösen Wucherungen später veranlaßt hat, kann nur sehr schwer entschieden werden.

Die karzinomatöse Umwandlung einzelner Polypen war in diesem Falle klar ersichtlich. Doch ließen sich keine sicheren Anhaltspunkte dafür finden, ob der Krebs primär von den Polypen oder von den Lieberkühn'schen Drüsen seinen Ausgang genommen hatten. Doch kann man sich schon vorstellen, daß die Entzündung, die hier unzweifelhaft zur Poly-

penbildung geführt hat, primär oder sekundär das harmonische Zusammenleben der Zellen so stört, daß damit der Grund zur krebigen Entartung gelegt ist.

Anders liegen die Dinge bei einem von Lufchka angegebenen Fall. Eine besondere Bedeutung hat dieser Fall dadurch, daß bei der Sektion außer einer ausgedehnten Polyposis namentlich des unteren Darmabschnittes nirgendwo etwas von einer karzinomatösen Umwandlung oder einer stärkeren Entzündung vorgefunden wurde. Der Exitus trat allmählich durch die immer stärker eintretenden Blutungen aus diesen Vegetationen ein. Von einer karzinomatösen Entartung war nirgendwo etwas festzustellen. Aus der Krankengeschichte sei kurz folgendes mitgeteilt:

Ein 30 Jahre alter sehr anaemisch aussehender Patient wurde wegen dauernder Diarrhoen ins Krankenhaus aufgenommen. Nach einigen Tagen traten ohne jede äußere Veranlassung starke Blutungen auf. Dabei gingen mehrere breiartige, blutig gefärbte Stühle ab. Kurz darauf fand man den Kranken kollabiert, mit fadenförmigem Puls. Der Exitus erfolgte sehr bald. Der Vater des Patienten teilte mit, daß seit 12—15 Jahren heftige und oft sehr blutige Diarrhoen vorhanden gewesen seien. Die Sektion ergab, daß polypöse Wucherungen sich über den ganzen Intestinaltraktus erstreckten, im Rektum aber besonders zahlreich vorhanden waren. Die Schleimhaut war mit Tausenden solcher Bildungen gleichsam übersät. Die meisten dieser Polypen hatten eine rötliche Färbung; die Vaskularisierung war schon mit bloßem Auge erkennbar. Ihrer Konsistenz nach mußte man sie als weiche Geschwülste bezeichnen. Die Größe der einzelnen Exkreszenzen war sehr variabel, von der kaum merklichen rundlichen, mit breiter Basis aufsitzenden Erhebung an bis zur Länge von mehreren Zentimetern. Meist waren diese Polypen aber gestielt. Die bald mehr, bald weniger in die Länge gezogenen Stielchen waren von ungleicher Dicke. Das freie Ende war aufgetrieben, eingekerbt oder gelappt.

Sehr wichtig ist, daß an der Oberfläche meist ein gut erhaltenes Zylinderepithel vorhanden war. Die Zellen waren zum Teil ausgezogen, glashell. Das Stützgewebe dieser Geschwülste bestand aus einer teils feinstreifigen, teils granulierten Grundsubstanz, in die eine Menge nackter rundlicher Kerne eingelagert war. Auch befanden sich in der Grund-

substanz kleinere und größere Zellen, die deutlich zwei Kerne mit Kernkörperchen aufwiesen. Gut zu sehen waren die vielen Blutgefäße, die zum Teil netzförmig untereinander verbunden waren, zum Teil schlingenförmig endeten. Ihre Wandungen hafteten so fest der Grundsubstanz an, daß es schwer gelang, sie vollkommen zu isolieren.

Zusammenfassend kann man über diesen Fall sagen, daß der Exitus durch die häufigen Blutungen aus den zahlreichen, reich vaskularisierten polypösen Auswüchsen erfolgte. Im Laufe der Zeit war ein solcher Grad von Anaemie eingetreten, daß der Tod unter den Erscheinungen der Inanition eintrat. Als primäre Ursache dieser Polyposis muß wiederum eine angeborene Anomalie angenommen werden; in der Anamnese sind keine Anhaltspunkte für eine Entzündung gegeben. Auch nach dem makroskopischen und mikroskopischen Befund kann eine solche nicht als ursächliches Moment angenommen werden. Wichtig ist ferner, daß keine krebssige Entartung gefunden wurde. Vielleicht hat der frühe Tod einer krebssigen Umbildung der multiplen Polypen vorgegriffen, vielleicht wäre es aber auch mangels Disposition nie zum Karzinom gekommen.

Anders sind die multiplen Exkreszenzen zu beurteilen, die Luschka bei einem fünf Jahre alten, nach überstandener Ruhr gestorbenen, Mädchen im Mastdarm beobachtete. In den zwei zentimeterlangen, meist gestielten Polypen wurden zystenartige, kleine, runde, von schleimiger Masse gefüllten Räume angetroffen. Außerdem lagen in der Submukosa wahre, mit selbständiger Wand versehene, hanfkorn- bis erbsengroße, durchscheinende Zysten. Manche besaßen in ihrer Höhle ganz unregelmäßige Scheidewände; die innere Oberfläche war sonst glatt, zeigte aber an manchen Stellen Zylinderzellen, die im Zerfall begriffen waren. Der Inhalt der Zysten stellte meist eine durchscheinende, schleimartige Masse dar, in der große rundliche kernhaltige Zellen suspendiert waren. Man kann annehmen, daß diese Zysten nicht durch schleimige Degeneration solitärer Follikel, sondern aus einer Umbildung Lieberkühn'scher Drüsen hervorgingen. Die Ausführungsgänge dieser Drüsen wurden wohl verstopft oder in irgendeiner Weise verlegt. Das Vorkommen der scheidenartigen Vorsprünge ins Innere mancher Zysten ist sicher durch das Zusammenfließen ganzer Drüsengruppen zu erklären. Ob diese Zystenbildung charakteristisch für einen entzündlichen Prozeß ist, konnte aus der Lite-

ratur nicht ersehen werden. Wichtig ist, daß nirgendwo die Folgen einer tieferen Ulzeration festzustellen waren. Auch waren die Polypen nicht narbigem Gewebe eingepflanzt. Sie erhoben sich vielmehr in Bezirken, die keine augenfälligen Veränderungen des Schleimhautgewebes zeigten. Man muß also annehmen, daß die Polypen vor der Dysenterie bestanden haben. Es muß wiederum ein erbliches Moment als Ursache der Polyposis angenommen werden.

Doch sind in der Literatur auch Fälle beschrieben, wo eine Entzündung direkt die Polypenbildung veranlaßt hat.

Ein großer Streit ist um die histologische Deutung des Epithelbefundes an diesen multipel auftretenden Polypen entstanden. Wichtig ist die Tatsache, daß es sich meist nicht um gewöhnliches Darmepithel handelt. Der regelmäßige Befatz mit Resorptions- und Sekretionszellen fehlt. An seine Stelle ist oft ein dichtgedrängtes hohes Zylinderepithel getreten, das verschiedene Kernreihen aufweist, aber in sich noch eine große Übereinstimmung in Zell- und Kernformen erkennen läßt. In anderen Fällen finden sich schon stärkere Abweichung, richtige Epithelpapillen. Auch wird oft Mehrreihigkeit der Epithelien mit Übereinanderschichtung, eigentümliche Anomalien der Kernteilung, viele Kernteilungsfiguren gefunden. Dann liegt der Verdacht einer beginnenden krebigen Wucherung sehr nahe. Die gelegentlich zu findenden Lückenbildungen in der Muskularis mukosae, die Verlagerung von Drüsen in die Tiefe der Muskularis beweisen an und für sich noch keine Bösartigkeit. Sogar das Eindringen in die Serosa oder bis in die Lymphknoten hat noch nichts mit Malignität zu tun. Es kann sich noch immer um Gewebsanomalien handeln. Versprengte Magenschleimhautinseln im Gebiet von Polypen sind ein eindeutiger Beweis hierfür. Die beginnende bösartige Entartung der Polyposis ist eben sehr schwer festzustellen. Erst wenn ein regellos zerstörender Charakter der Wucherung hervortritt, erst wenn deutlich reaktive Veränderungen an den umgebenden Geweben in Erscheinung treten, kann man von beginnender krebiger Entartung sprechen.

Anhand sehr vieler Fälle ist bewiesen, daß ein Zusammenhang zwischen multiplen Polypen und Krebsbildung unbedingt bestehen muß. Auch steht fest, daß entzündliche Reize die maligne Entartung der Polyposis bedingen können, obwohl sie es nicht unbedingt brauchen. Viele

Forscher sehen in entzündlichen Reizen die Hauptursache der krebigen Umbildung polypöser Wucherungen. Doch werden wohl viele Faktoren zusammentreffen und die krebige Entartung bedingen. Eine Schleimhaut, die zur multiplen Polypenbildung neigt, besitzt an und für sich schon eine gesteigerte Proliferationstätigkeit; die in das Darmlumen vorragenden Polypen werden durch die Kotmassen dauernd heftig gereizt. Zinner berichtet von 6 Fällen von multipler Polypenbildung, die karzinomatös entartet sind. Rotter sah unter 18 Fällen von Polyposis 6 mal Mastdarmkarzinom. Kraske, Hauser, Bardenheuer, Richter u. a. berichten von zahlreichen derartigen Krankheitszuständen.

Sehr wichtig ist es festzustellen, ob die an und für sich gutartig zu nennenden Drüsengeschwülste durch irgendeine Ursache einen bösartigen Charakter annehmen oder ob ein Karzinom Anlaß zu den ausgedehnten Polypen gab. Hat der Krebs vor der Bildung der Polyposis bestanden? Um diese Frage beantworten zu können, ist es unbedingt erforderlich, auf die Erfassung der Krebsursache etwas einzugehen.

Trotz unendlich vieler Bemühungen auf dem Gebiete der Krebsforschung ist es bis heute noch nicht gelungen, die eigentliche Krebsursache festzustellen. Es würde zu weit führen, all die Vermutungen anzuführen, die auf diesem Gebiet gehegt wurden. Doch ist es zweckmäßig, wenigstens auf die geläufigsten Erklärungen einzugehen.

Beginnen will ich mit der sogenannten parasitären Theorie, mit der Vorstellung, daß der Krebs eine Infektionskrankheit sei. Diese Theorie, die wohl dem Laien, der die Vorstellung hat, daß dem Krebs ebenso wie z. B. der Tuberkulose oder der Lues ein Erreger zugrunde liegen müßte, am besten einleuchtet, ist wohl von allen Vorstellungen die am wenigsten gesicherte. Wohl können Lebewesen als Reiz wirken und dadurch Einfluß auf die Krebsbildung haben. Als Beispiel mögen die Bilharziae dienen, die chronische Entzündungen der Blase und damit nicht selten Karzinom herbeiführen können.

Wesentlich größere Bedeutung als die parasitäre hat wohl Reiztheorie, die zeitweise ganz in den Hintergrund getreten und keinen geringeren als Virchow zum Urheber hat. Virchow zeigte, daß sich ein Krebs gerne auf dem Boden einer chronischen Entzündung, in der

Nähe von Fisteln und Druckstellen, von Ekzemen und Geschwürsbildungen entwickelt. Einige Beispiele, die hier genannt seien, weisen mit größter Wahrscheinlichkeit auf einen derartigen Zusammenhang hin. Daß Gallenblasenkrebs und Gallensteine häufig zusammen auftreten, ist allgemein bekannt. Uteruskrebs tritt bei Frauen, die häufig geboren haben, öfters als bei Nulliparen auf. Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang auf die Beziehungen zwischen Darmkrebs und chronischer Darmentzündung hinzuweisen; der Krebs des Darmes befindet sich meist an den Umbiegungsstellen des Darmes, also an Stellen, die bei der Kotstauung dem Druck am stärksten ausgesetzt sind. Überhaupt zeigen die am stärksten beanspruchten Darmteile wohl auf dem Wege einer chronischen Entzündung krebfige Entartung.

Alles das weist auf die Bedeutung äußerer Reize als Auslösungsurfache der Geschwulstentwicklung hin. Die chronische Entzündung, Geschwürsbildung u. dergl. führen durch die immer wieder auftretende Teilung zur Entdifferenzierung der Zelle. Damit ist notwendigerweise eine gesteigerte Wachstumsfähigkeit verbunden, die sich aber meist in einer Funktionsstörung äußert. Es liegt eine Art krankhafter Regeneration und Superregeneration vor. Derartig wahrnehmbare Prozesse, die einem Krebs vorangehen und wahrscheinlich in einem formalgenetischen Zusammenhang miteinander stehen, bezeichnet man am besten mit Orth als praekanceröser Vorgang. Die so oft die Brücke zwischen Reiz und Krebs bildenden Papillome und Polypen gehören in dieses Gebiet. Der wiederholt auftretende Teilungsvorgang in den Zellen führt zur gesteigerten Entdifferenzierung und weiter zu blastomatösem Wachstum. Derselbe Reiz, der das praekanceröse Stadium herbeiführt, wirkt oft als Auslösungsurfache für den Krebs. Auf dem Wege einer Hyperplasie kommt es zur Karzinomentwicklung. Andere Fälle zeigen aber wieder, daß es trotz des chronischen Reiz- bzw. Entzündungszustandes nicht zur Krebsbildung, ja nicht einmal zur Hyperplasie des betroffenen Gewebes kommt. Aus Magenulcera entstehen nur in einem kleinen Hundertsatz Krebse; Narben bilden nur in einem Bruchteil die Grundlage eines Hautkarzinoms. Ferner kennen wir chronische Darmentzündungen, die niemals weder zur Polypenbildung, noch später zum Krebs führen. Man muß notwendigerweise neben der Entzündung und dergl. als auslösende

Faktoren bei den Menschen, bei denen es zur Krebsbildung kommt, noch besonders bestimmende Momente annehmen. Damit komme ich zu dem äußerst wichtigen Schluß, daß sowohl für die einfache Polypenbildung als auch für die krebsige Entartung neben dem auslösenden Faktor eine besondere Krankheitsdisposition vorhanden sein muß.

Diese Disposition kann angeboren — ererbt oder intrauterin erworben — oder im extrauterinen Leben erworben sein. Sie setzt sich aus sehr verschiedenen Faktoren zusammen und es ist schwer, selbst im Tierversuch diese einzeln zu trennen und so zu eindeutigen Schlüssen zu kommen. Von der Polypositas rekti muß man annehmen, daß sie ein angeborenes und zwar ererbtes Leiden ist. Wohl sind in der Literatur viele Fälle bekannt, wo es infolge von Entzündung zur Polypenbildung kam. Doch gibt es keinen Fall, wo eine Polypositas rekti oder intestinalis vorhanden war, ohne daß angeborene, ererbte Disposition die Hauptursache der Krankheit bildete. Bei der krebsigen Entartung der Polypositas rekti tritt die ererbte Disposition ebenfalls so stark in den Vordergrund, daß die Entzündung als auslösender Faktor ganz zurücktritt. Vielleicht kann man sich den Vorgang bei der krebsigen Entartung der Polypositas rekti so vorstellen, daß die Zellen oder Zellgruppen des Rektums schon von Anfang an eine gesteigerte Wachstumsenergie in sich trugen. Diese führte zur Polypositas und dann entweder direkt oder auf dem Wege der chronischen Entzündung zur krebsigen Umbildung. Lange Zeit können diese zu besonderem Wachstum praedisponierten Zellen in einem indifferenten Zustand unverwendet liegen bleiben und, wohl gerade deshalb besonders wucherungsfähig, auf eine kleine Auslösungsurfläche hin ins blastomatische Wachstum geraten. Diese Anomalien der Zellen kann man naturgemäß nicht mit dem Mikroskop wahrnehmen, da sich diese Zellen morphologisch nicht von den anderen unterscheiden. Nur aus späteren Formveränderungen kann man das Vorhandensein solcher praedisponierter Zellen und ihre Rückdatierung ins embryonale Leben erschließen.

Man kann sagen, daß es zunächst das fortschreitende undifferenzierte Verhalten der Zellen, dann aber auch die veränderte Einfügung ist, die zu besonderem Wachstum Anlaß gibt. Ersteres betont C o h n h e i m, letzteres Ribbert. Die mit besonderer Wachstumsenergie ausgezeichneten Zellen müssen in ein ganz besonderes Verhältnis zum Zellverband

treten. Die Schranken, die die einzelnen Zellen aneinanderketten, müssen beim blastomatösen Wachstum leichter wegfallen können. Tritt nun als Auslöpfungsfaktor eine oft unbedeutende Entzündung, die sich unserem Auge vollständig entziehen mag, ein, so ist dem unbefchränkten Wachstum der Zellen kein Einhalt geboten.

Überschaute man die Beziehungen, die in diesem Zusammenhang zwischen Polypofitas rekti und normaler Mukosa einerseits und zwischen Polypofitas rekti und Krebs andererseits bestehen, so muß bei der Frage nach der Ursache unbedingt ein bestimmender und ein auslösender Faktor unterschieden werden. Ersterer besteht als inneres Moment in einer Disposition zum blastomatösen Wachstum.

Neuerdings hat uns Warburg Wege gezeigt, die gestatten, noch tiefer in das Geschwulstproblem einzudringen. Er betrachtet die ganze Frage nicht von der morphologischen Seite, sondern sucht durch richtige Deutung von Stoffwechselanomalien auf den rechten Weg zu kommen.

Betrachtet man die Beziehungen, die zwischen Polypofis und Karzinom von der Stoffwechselseite aus bestehen, so kann man feststellen, daß bei der Polypofis dem benignen Wachstum entsprechend weniger Milchsäure vorhanden ist, als bei der krebigen Umwandlung der Polypen. Dieses Verhalten entspricht voll und ganz den Erfahrungen der Pathologen, die hier keine festen Grenzen kennen. So kann nach Warburg der Schluß gezogen werden, daß Sauerstoffmangel an und für sich oder mangelhafte Verarbeitung des Sauerstoffes in den Zellen einen Reiz zur Krebsbildung bildet, daß gesteigerte Glykolyse und die durch mangelhafte Resynthese bedingte Vermehrung der Milchsäure die treibenden Kräfte für das Wachstum sind. Sekundär schädigen nun die an und für sich benignen Geschwulstzellen durch ihren anormalen Stoffwechsel das umgebende Gewebe. Werden diese anormalen Stoffwechselprodukte besonders zahlreich oder vor allen Dingen längere Zeit hindurch abgegeben, so könnte es hierdurch allein schon zur malignen Umbildung einer zuerst gutartigen Geschwulst kommen. So wäre der Übergang einer benignen in eine maligne Geschwulst zu erklären, ohne daß andere Umstände dabei eine Rolle zu spielen brauchten. — Von ausschlaggebender Bedeutung ist die Frage, ob wir von unseren Eltern die Krebskrankheit erben können, ob wie sie auf unsere Kinder weiter vererben? Hierauf muß geant-

wortet werden, daß Krebs im allgemeinen nicht vererbt wird; wohl ist, wie oben betont, die Disposition vererbbar. Dann ist die Frage von ganz besonderer Bedeutung, ob diese erblich erworbene Disposition zur Krebskrankheit im Einzelnen nachweisbar ist oder nicht; kann man sie beseitigen oder muß der Belastete unbedingt der Krankheit verfallen? Diese Fragen sind heute noch sehr schwer zu beantworten. Im allgemeinen darf man wohl sagen, daß mit der erwähnten Krebsveranlagung unbedingt die Disposition einzelner Individuen zur Krebskrankheit verbunden sein muß, ohne die kein Mensch krebskrank werden kann. Von der multiplen Polypenbildung im Rektum wird wohl angenommen, daß sie vererbbar ist und auch als Vorstadium des Krebses aufgefaßt werden muß. Es steht aber nicht fest, daß diese Krankheit unbedingt zum Krebs führen muß. Man könnte annehmen, daß eine angeborene Immunität es niemals zum Krebs kommen läßt. Doch ist das klinische Bild der Polyposis so schwer, daß infolge des frühen Todes Beobachtungen sich in dieser Hinsicht äußerst schwer feststellen lassen.

Doch ist es in diesem Zusammenhang angebracht, etwas auf diese Immunität gegen Krebs einzugehen. Große experimentelle Forschungen haben gezeigt, daß, wenn man einem Tier einen Krebs einimpft, es im allgemeinen gegen neue Geschwulstinfektionen gleicher Art immun ist. Nach gelungener operativer Krebsheilung kann ein Mensch jahrelang immun gegen neue andersartige Krebserkrankungen bleiben. Dieser erworbenen Immunität steht die angeborene gegenüber, die den Menschen in einen krebsfesten und einen krebsgeeigneten unterscheidet und wohl lebenslänglich anhält. Sichere Anhaltspunkte gibt es augenblicklich nicht, obwohl diese Frage für die Frühdiagnose des Krebses durch die Blutuntersuchung von ausschlaggebender Bedeutung wäre.

Faßt man das Gefagte über die Krebsursache zusammen, so kommt man zu dem Ergebnis, daß die wirkliche allgemein gültige Krebsursache bis heute noch unbekannt ist. Man muß eben feststellen, daß der Krebs keine einheitliche Ursache hat. Mehrere Faktoren müssen zusammentreffen! Richtig ist auf jeden Fall, daß örtliche Reize in Gemeinschaft mit allgemeiner Krebsdisposition eine Krebsursache darstellt.

Wichtig ist an dem Krankheitsbild der Polyposis und auch ihrer krebigen Umbildung, daß die Kranken oft mit ganz geringfügigen Beschwerden zum Arzt kommen. Prof. Bürger (Bonn) berichtet in der Med.

Poliklinik von einem Patienten, der längere Zeit nur über ischiasähnliche Schmerzen klagte. Erst nach längerem Befragen wurde angegeben, daß schon längere Zeit hindurch öfters blutige und breiige Stühle entleert wurden. Interessant ist ferner, daß der Kranke durch die schweren Erscheinungen nicht im geringsten belästigt wurde und seinem Beruf voll und ganz genügen konnte. Der Ernährungszustand war ein durchaus guter, ein Zeichen, daß ein körperlicher Verfall lange nicht immer zum Krankheitsbild der krebösen Entartung der Polyposis gehört. Drüsen und Leber waren ohne besonderen Befund, auch Blut und Blutflussgeschwindigkeit, die gewöhnlich beim Krebs erhöht, waren vollkommen normal. Im Röntgenbild zeigt sich neben einzelnen Divertikeln eine Ausparung etwas oberhalb des Mastdarms. Bei der digitalen Untersuchung gelangte man gleich auf weiche, polypöse Massen. Die Wucherungen der Rektalschleimhaut reichten dicht bis an die Analöffnung heran, kamen jedoch nicht nach außen zum Vorschein. In der Umgebung der stenosierten Stelle bestand eine Infiltration des umgebenden Gewebes. Sonst waren die Geschwulstmassen noch etwas verschieblich. Doch ergab die weitere Untersuchung, daß sehr viele Polypen nekrotisch waren und karzinomatöse Entartung zeigten. Prof. Bürger wies besonders darauf hin, daß solche Bildungen sehr leicht übersehen und Patienten mit ähnlichen Beschwerden auf Haemorrhoiden oder Ischias behandelt würden. Digitale oder rektoskopische Rektaluntersuchungen können die Diagnose klären und dem Kranken von sehr großem Nutzen sein. Bei kleineren Symptomen wie leichter Druck im Unterbauch, Hämorrhoidalbeschwerden, wässriger Stuhl, als Spritzer entleert, müssen immer verdächtig auf eine maligne Bildung im Mastdarm sein. Körperliches Wohlbefinden, normaler Blutbefund, normale Blutflussgeschwindigkeit beweisen noch lange nicht, daß im Rektum eine maligne Bildung nicht vorhanden ist.

Mandl berichtet von einer zwölfjährigen Patientin, die seit 1½ Jahren krank ist und wegen Polyposis rekti operiert wurde. Nach viermonatlichem Wohlbefinden befand sich Blut im Stuhl. Dazu gefellten sich hochgradiger Schmerz und enorme Abmagerung. Am Übergang des Rektums in die Flexur befand sich eine durch einen Tumor bedingte, für die Fingerkuppe nicht passierbare Stenose. Die Obduktion ergab ein exulzeriertes jauchiges Karzinom. Mesenteriale und retroperitoneale Drü-

fen waren stark infiltriert. Rotter beobachtete bei 50% der an Karzinoma rekti zum Exitus gekommenen Kranken eine Polyposis des unteren Darmabschnittes. Bei einem Drittel der an Karzinoma rekti Erkrankten war neben dem Karzinom auch die Polyposis klinisch feststellbar. Mandl teilt mit, daß er bei 12% der Mastdarmkrebskranken eine Polyposis festgestellt habe.

Beyer fand bei einem Kinde die ganze Schleimhaut des Mastdarmes mit rundlichen, weichen, schwammigen Exkreszenzen bedeckt, die zu starken Blutungen Anlaß gaben und nach der Exstirpation wieder hervorkeimten. In der Literatur werden aber auch Fälle von Mastdarm-polyposis beschrieben, die keine erheblichen Beschwerden verursachen. Man wird auf die Existenz solcher Bildungen mitunter nur dadurch aufmerksam, daß mit jeder Stuhlentleerung einige Tropfen Blut abgehen. Meist ist die Polyposis rekti die Quelle zahlreicher und durch diese Häufigkeit gefährlicher Blutung.

Vagda berichtet im Jahrbuch für Kinderheilkunde über folgenden Fall: Ein neunjähriger Junge hat seit drei Jahren flüßige, oft blutige Stühle, die auch während des Krankenhausaufenthaltes anhalten. Dabei besteht hochgradige Anaemie. Bei der Untersuchung der Rektalschleimhaut zeigten sich eine Unmenge kleiner dichtgedrängter Geschwülstchen. Bei der Autopsie fand man den Dickdarm und vor allem den Mastdarm mit hirsekorn- bis bohngroßen, glatten, weichen Exkreszenzen gleichsam überfät. Diese mehr oder weniger erhabenen Bildungen reichten bis ins Coecum, waren im Kolon ascendenz zahlreich und, wie schon gesagt, im Rektum besonders dicht. Im S. romanum dagegen waren sie ziemlich spärlich. Bei der histologischen Untersuchung wurde die festgestellte Diagnose Polyposis intestinalis bestätigt. Von einer vorhergegangenen Entzündung war nirgendwo etwas festzustellen.

Ein sehr interessanter Fall von polypösen Wucherungen im Rektum und späterer krebßiger Entartung hat Hauser beschrieben. Dieser Fall betrifft einen 33jährigen Mann, der 11 Wochen vor seiner Aufnahme in das Krankenhaus an starken Diarrhoen und darauffolgenden heftigen Schmerzen im Unterleib erkrankt war. Blutiger Stuhl wurde festgestellt. An manchen Tagen wurden 15—20 Stuhlgänge beobachtet, wobei allerdings nur ganz wenig Kot, mit Blut und Schleim untermischt, abging. Manch-

mal wurden nur geringe Mengen blutigen Schleims entleert; manchmal auch übelriechende Flüssigkeit. Dazwischen bestand auch wieder fast normaler Stuhlgang. Früher klagte der Patient häufig über Obstipationen. Zur Zeit der Aufnahme ins Krankenhaus ist der Kranke sehr abgemagert, von kachektischem Aussehen. Bei der digitalen Untersuchung des Mastdarms stieß man auf warzige, weiche, polypöse Wucherungen, die weit aus dem After heraushingen. Normale Schleimhaut war nirgendwo zu erreichen. Die Stenose war unbedeutend. Die Geschwulstmassen konnten in toto noch etwas auf der Unterlage verschoben werden; in der Mitte der Wucherung befand sich eine Geschwürbildung. Die untersuchten inneren Organe zeigten nichts abnormes. Der Exitus erfolgte infolge Peritonitis und Pneumonie. Die Sektion ergab eine karzinomatös entartete multiple Polypenbildung des Intestinaltrakts, besonders des Mastdarms.

Eine gute Übersicht über die Polypen gibt Schmieden, indem er zuerst den Entdifferenzierungszustand, dann das Verhalten der Drüfenschläuche zueinander und zuletzt den Grundstock und das makroskopische Aussehen ins Auge faßt. Auch die Einteilung der Polypen in relativ gutartige, in relativ bösartige und absolut bösartige ist sowohl für die Diagnose, als auch für die Therapie von größter Bedeutung. In seiner grundlegenden Arbeit weist Schmieden ganz besonders auf die kleinen, erbsengroßen Polypen hin, die auf Grund ihres organoiden inneren Zusammenhanges hin und ihrer Neigung zum Tiefenwachstum wegen, ganz besonders gefährlich sind. Ferner ist nach Schmieden der manchmal plötzliche Beginn des Leidens, das oft für eine Ruhr oder eine ähnliche Erkrankung gehalten wird, ferner der Auftritt von Remissionen und die Erfolglosigkeit jeder konservativen Behandlungsmethode von ausschlaggebender Bedeutung. Bei einem Fall von Polyposis weist Schmieden auf eine starke Eosinophilie hin, die für die Polypenbildung charakteristisch sein soll. Daß ein Übergang von absolut gutartigen in relativ bösartige und zuletzt in absolut bösartige Polypen vorhanden ist, belegt Schmieden an Hand sehr vieler Fälle. Der Forscher weist ganz besonders darauf hin, daß man einen großen Unterschied zwischen Polypen auf entzündlicher Grundlage und echten Polypen, d. h. Blastomen zu machen hat. Ruhrpolypen z. B. bestehen aus wahllos zusammengeballten Bindegewebsmassen und hyperplastischen Schleimhautfetzen. Echte Polypen dagegen zeigen

eine Entdifferenzierung der Zellen. Auch das Protoplasma zeigt wichtige Unterschiede. Ruhrpolypenzellen zeichnen sich durch lebhaftes Schleimproduktion aus. Außerdem sind sehr wenig Fälle bekannt geworden, wo durch Ruhrpolypen Carzinom entstand. Wohl wird immer betont, daß echte Polypen auf Grund ihres anatomischen Baues mechanischen Schäden ganz besonders ausgesetzt sind und dadurch bei der mikroskopischen und makroskopischen Untersuchung oft einen entzündlichen Einschlag zeigen. Die primäre Ursache ist aber eine angeborene Disposition und zwar eine spezifische Organ- und Zelldisposition. Als auslösendes Moment kommt dann eine mechanische, chronisch entzündliche Irritation in Frage. Sehr eingehend beschäftigt sich Schmieden mit der Frage, wie eine Polypenbildung, eine beginnende oder fortgeschrittene Entartung der Polypen diagnostisch festzustellen ist. Auf Farbe, Ulzeration und Form der Polypen ist ganz besonders zu achten. Langgestielte Polypen zeigen lange nicht die Malignität der kleinen, plumpen, breitblättrigen Polypen. Niemals neigt ein langgestielter Polyp zur Rezidivbildung. Für die Therapie und auch für die Prognose ist weiter die Frage wichtig, ob es sich um echte Polypen oder um Pseudopolypen handelt. Als Pseudopolypen haben Ruhrpolypen und hyperplastische Lymphknötchen größere Bedeutung. Auf Grund der Anamnese und Probeexcision wird die Diagnose Ruhr kaum Schwierigkeiten machen. Anders steht es mit den hyperplastischen Lymphknötchenpolypen. Doch sind ausgedehnte hyperplastische Lymphknötchen im Dickdarm sehr selten und können durch die histologische Untersuchung sicher erfaßt werden. Zur Ausführung der Probeexcision ist zu bemerken, daß mindestens von 2—3 verschiedenen Gegenden Stücke zu entnehmen sind. Nur so kann man sich ein einigermaßen zuverlässiges Bild von der Art der Polypen machen. Das ist für die Diagnose der Polypen und auch der krebigen Umwandlung einzelner oder mehrerer Polypen von ausschlaggebender Bedeutung. Dann muß auch die Totalexcision einiger ganz kleiner Polypen erfolgen, da, wie schon vorher betont, sich gerade an den kleinen Polypen eine ganz besondere Bösartigkeit bemerkbar macht.

Wichtig an dem Krankheitsbild der Polyposis und auch der krebigen Entartung ist, daß die Kranken oft mit ganz geringfügigen Beschwerden zum Arzt kommen. Interessant ist weiter, daß die Polyposis rekti und damit auch die krebige Umbildung meist in den ersten drei Dezennien

in die Erscheinung tritt. Gerade beim Rektumkarzinom spricht die Jugend des Patienten nicht immer gegen eine Krebsdiagnose! Leider werden, da wohl die Tatsache der relativen Häufigkeit des jugendlichen Karzinoms nicht genügend bekannt ist, noch immer eine Reihe von Fehldiagnosen gestellt. Bei digitaler oder rektoskopischer Rektaluntersuchung wird man fast immer einen Tumor im Mastdarm feststellen können. Wenn dann noch die mit großer Regelmäßigkeit auftretenden Blutungen hinzukommen, steht die Diagnose fest.

Anhand sehr vieler Fälle hat sich gezeigt, daß die Operation bei der Polypositas rekti und namentlich bei der krebsigen Umwandlung der Polypen nur eine scheinbare Heilung erzielt. Meist sind die multipel auftretenden Polypen operativ garnicht zu erfassen. Dann bedingt der durch die Operation verursachte starke Reiz die Bildung neuer Polypen, die nun besonders schnell karzinomatös entarten.

Ist der Dünndarm der Sitz der Polyposis, so wird nach Möglichkeit die Resektion des betreffenden Darmabschnittes mit samt des Mesenteriums und Wiederherstellung der Kontinuität des Darms durch End-zu-End- oder Seit-zu-Seit-Anostomose erstrebt. Bei der Dickdarmpolyposis gilt der Grundsatz, nur dann die primäre Resektion durchzuführen, wenn die Operation nicht im Ileustadium zu erfolgen braucht. In diesem wird nur eine entlastende Operation durch Anlegung eines Anuspräters, proximal von der entarteten Stelle, ausgeführt und die Resektion in einer zweiten Sitzung an dem entlasteten Darm vorgenommen. Ist die Entartung operativ nicht zu erfassen, so muß, um eine etwaige starke Blutung in einem bestimmten Darmabschnitt oder eine Unwegsamkeit der Darmpassage zu beheben, eine Anostomose zwischen dem zu- und abführenden Abschnitt vorgenommen werden. Durch diese Maßnahme wird eine Ausschaltung des erkrankten Darmabschnittes erreicht. Sind Cecum, Flexura hepatica oder Flexura lienalis Sitz ausgedehnter Polypenbildung, so muß die einzeitige, gelegentlich auch unter Beachtung der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, die in dauernder Drainage des ausgeschalteten Darmstücks nach außen bestehen, die zweizeitige Ausschaltung durchgeführt werden. Es wird eine Anostomose des zuführenden Darmteils mit einem distal vom entarteten Darm gelegenen Abschnitt als Ileokoloostomie oder Ileosigmoidostomie hergestellt. Sitzt die Polyposis im Kolon transversum oder an der

Flexura sigmoidea, so kann auch nach der Mobilifation des erkrankten Darmstückes die Vorlagerung der Darmschlinge und Einnähung in die Bauchwand nach Heinecke-Mikulicz zur Ausführung kommen. In zweiter Sitzung wird dann der vorgelagerte Darmabschnitt abgetragen; der entstandene doppelläufige Anus präter wird nach einiger Zeit in einer dritten Sitzung geschlossen. Ist dagegen im Mastdarm der Sitz der polypösen Wucherung, so erfordert die Operation in jedem Fall eine besondere Vor- und Nachbehandlung. Vor dem operativen Eingriff ist für eine gründliche Darmentleerung Sorge zu tragen. Das gelingt am besten durch Rizinusgaben. Nach der Operation wird für flüssige Kost geforgt und vier Tage lang dreimal täglich 15—20 Tropfen Tinktura opii verordnet. Nach dieser Zeit wird wieder Rizinus gegeben, damit der Stuhl ausgiebiger gestaltet wird.

Bei hohem Sitz der Mastdarmpolyposis kann auf die Erhaltung des Schließmuskels hingezielt werden. In erster Sitzung wird ein Anus präter möglichst hoch an der Sigmanschlinge angelegt. In zweiter Sitzung, die im Laufe einer oder zweier Wochen nach dieser Operation erfolgt, wird das Rektum von hintenher unter Entfernung des Steißbeins und des unteren Kreuzbeinwirbels nach dem Vorschlag von Kraske freigelegt. Auf den Zustand des Kranken ist in jedem Fall besondere Rücksicht zu nehmen. Nach der Mobilifation des Rektums und Eröffnung des Peritoneums wird die Sigmaschlinge heruntergeholt. Das entartete Darmstück wird refeziert und die heruntergeholte Sigmaschlinge nach Hoheneggs Angabe durch den stehengebliebenen analen Teil des Rektums gezogen. Die Fixation erfolgt außen an der Haut durch Naht. Darauf wird das Peritoneum wieder verschlossen und die Wunde tamponiert. Dieses zweizeitige Verfahren bezweckt eine Schonung der meist schwerkranken Patienten und hat auf die Wundheilung infolge der guten Ableitung des Kots einen günstigen Einfluß.

In den meisten Fällen aber ist der Sitz der Polyposis rekti so tief, daß mit einer Erhaltung des Sphinkter ani nicht gerechnet werden kann. Ist die Indikation zur Operation gestellt, so muß die Totalexstirpation des Rektums auf abdominofakralem Wege nach den Vorschlägen von Kirchner angestrebt werden.

Die Laparotomie erfolgt in der Mittellinie. Nach Durchtrennung des Peritoneums und beiderseitiger Unterbindung der Arteria hypogastrica wird die Sigmafchlinge beweglich gemacht. Das Rektum muß dann bis zum Anus hin stumpf gelöst werden. Unterhalb der Wucherung erfolgt die Durchtrennung des Rektums. Beide durchtrennte Schenkel werden durch die Tabaksbeutelnaht verschlossen; das proximale Darmende wird durch eine neue, links neben dem linken Rektus gelegte, Öffnung herausgeleitet und zum Anus inguinalis verwendet; das distale Darmstück wird ins Becken versenkt und das Peritoneum darüber geschlossen. In zweiter Sitzung, die gleich oder einige Tage später erfolgt, wird der distale Rektumteil total exstirpiert. Der Operationschnitt umkreist den After; die Exstirpation erfolgt mit oder ohne Kreuzbeinresektion. Zum Schluß wird die entstehende Wundhöhle locker tamponiert.

Nach Anlegung des Anus inguinalis wurde häufig die Beobachtung gemacht, daß sich das Befinden des Kranken wesentlich besserte. Die Schmerzen und auch die Blutungen nahmen, wohl durch Rückgang der entzündlichen Vorgänge, beträchtlich ab. Der Anus inguinalis ermöglicht dem Kranken eine sehr gute Reinhaltung und kann durch eine Pelotte besser verschlossen werden, als der sakrale oder perineale. Ist die Polyposis ausgedehnt, daß sie operativ garnicht zu erfassen ist, veranlassen aber starke Schmerzen, starke Blutabgänge oder Stenoseerscheinungen den Arzt zu operativem Handeln, so kann ein einfacher doppelläufiger Anus inguinalis nach dem Vorschlag von Maydl oft wertvolle Dienste leisten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die multiplen Polypen im Instestinaltraktus und namentlich im Mastdarm lange Zeit bestehen können, ohne irgendwelche Krankheits Symptome zu verursachen, ohne karzinomatös zu entarten; ja manchmal werden diese Wucherungen nur als Nebenfund bei einer Sektion festgestellt. Vielfach sind die klinischen Erscheinungen aber so schwer, daß der Exitus schon sehr früh eintritt. Das klinische Bild der karzinomatös entarteten multiplen Polypen des Mastdarms zeigt keine wesentlichen Unterschiede gegenüber dem eigentlichen Mastdarmkarzinom. Durchfälle, manchmal von katastrophalem Ausmaß, treten fast immer auf. Meist zeigen diese Diarrhoen dem Kranken erst, daß mit seinem Darm etwas nicht in Ordnung ist. Dazu gesellen sich noch Blut- und Schleimabgänge. Manche Autoren geben Obstipatio-

en abwechselnd mit Diarrhoe als weiteres Zeichen für die krebfige Entartung der Polyposis an. Treten dazu noch Leibschmerzen, öfters sogar kampfartig, Schmerzen im After und im Kreuz, so ist an der Diagnose der karzinomatösen Umbildung der Polyposis nicht mehr zu zweifeln.

Die operativen Maßnahmen müssen im allgemeinen als palliative Maßnahmen aufgefaßt werden. Der Exitus läßt meist nicht lange auf sich warten und erfolgt entweder durch die Schwere des Krankheitsbildes, das die Polyposis an und für sich bedingt oder an den Folgen, die eine krebfige Umbildung mit sich bringt. Peritonitis oder Ileus werden in der Literatur als letzte Todesursachen angegeben. Interessant ist aber die Tatsache, daß von Kachexie, die sonst als Folgeerscheinung des Krebses so deutlich in Erscheinung tritt, bei der krebfigen Entartung der multiplen Polypen nur selten die Rede ist.

Zum Schluß erfülle ich die angenehme Pflicht, Herrn Prof. Graff für die gütige Überlassung und Durchsicht der Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literaturangabe.

1. Darmkrebs im jugendlichen Alter.
Stämmler, Neue Deutsche Klinik.
2. Der Darmkrebs im Kindesalter.
Zuppinger, Wiener klinische Wochenschr. 1900.
3. Über polypöse Vegetationen der gesamten Dickdarmschleimhaut.
Lufchka.
4. Über Mastdarmkrebs.
Mandl, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 168 (1922).
5. Über das Problem des Krebses.
Schmieden, Frankfurter gelehrte Reden und Abhandlungen.
6. Jahrbuch für Kinderheilkunde.
Vagda.
7. Eine seltene Form von multiplen Drüsenwucherungen der gesamten
Dickdarm- und Rektalschleimhaut neben Ca. rekti.
Franz Bardenheuer, Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 41.
8. Über Polyposis intestinalis aden. und deren Beziehung zur Krebsent-
wicklung.
Hauser, Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. 55, Vogel Leipzig.
9. Zur Diagnose der Rektumkarzinome.
Küttner, Zeitschrift f. Krebsforschung 7 (1908).
10. Mastdarmkarzinom im jugendlichen Alter.
Lück, Inaug.-Diff. 1904.
11. Vererbung der Konstitution.
Zeitschrift für Krebsforschung, Bd. 39, H. 1.
12. Sterblichkeit und Beziehung zum Alter.
Zeitschrift für Krebsforschung, Bd. 38, H. 1.
13. Blutbildung beim Krebs.
Zeitschrift für Krebsforschung, Bd. 38, H. 4.
15. Praekarzinom.
Zeitschrift für Krebsforschung, Bd. 38, H. 6.
16. Über den Mastdarmkrebs.
Zinner, Arch. f. klin. Chirurg. 90 (1909).
17. Spezielle Pathologie und Therapie.
Nothnagel, Wien 1859; Bd. 17; 1, 2.

18. Handbuch der praktischen Chirurgie, Bd. III I.
v. Bergman, v. Bruns, v. Mikulicz.
19. Handbuch der gesamten Therapie.
Benzoldt-Stinzig.
20. Pathologie und Therapie der Krankheiten des Verdauungsapparates.
Rosenheim, Bd. 2.
21. Die Therapie an den Bonner Universitäts-Kliniken.
Rudolf Finkelnburg, Markus und Weber, Berlin 1931.
22. Diagnose und Therapie der Darmkrankheiten.
Boas, Leipzig 1912.
23. Klinik der Darmkrankheiten.
Schmidt-v. Noorden, Wiesbaden 1921.
24. Handbuch der praktischen Medizin.
Ebstein-Schwalbe, Bd. 2.
25. Zur Klinik und Pathologie der Dickdarmpolypen und deren klinischen
und pathologisch-anatomischen Beziehungen zum Dickdarm-
karzinom.
Schmieden, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 202.

Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Franz Tollmann, zu Grevenbroich, am 19. Juli 1909 als Sohn des praktischen Arztes Dr. med. Johann Tollmann und seiner Gattin Agnes, geborene Abels. Die Volksschule besuchte ich in meinem Heimatort Grevenbroich. Dann bezog ich das Progymnasium am gleichen Orte und erhielt daselbst die Obersekundareife; die letzten drei Gymnasialjahre absolvierte ich auf der Oberrealschule mit Reformgymnasium zu Neuß und bestand dort am 14. 2. 1929 die Reifeprüfung. Die ersten drei Semester meines Medizinstudiums verbrachte ich in Freiburg i. Br. Die beiden letzten Semester vor der ärztlichen Vorprüfung studierte ich in Bonn. Hier bestand ich unter dem Vorsitz des Herrn Prof. Sobotta am 22. August 1931 die ärztliche Vorprüfung. Nach bestandener ärztlicher Vorprüfung studierte ich 1 Semester an der Universität Berlin, 1 Semester an der Medizinischen Akademie in Düsseldorf und 1 Semester an der Universität zu Freiburg i. Br. Im Sommersemester 1933 kehrte ich an die Universität Bonn zurück und verbrachte hier die letzten drei Semester meines medizinischen Studiums. Hier bestand im im WS. 1934/35 das medizinische Staatsexamen.

